

ABAU 2024 Junio Galicia

Pregunta 1. Números y Álgebra. (2 puntos)

Sean A y B dos matrices tales que $A + 2B = \begin{pmatrix} 6 & -3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ y $A + B = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

- a) Calcule A^2 .
- b) Calcule la matriz X que satisface la igualdad $A^2X - (A + B)^T = 3I - 2X$, siendo I la matriz identidad de orden 2 y $(A + B)^T$ la traspuesta de $(A + B)$.

Respuesta.

a) $A = 2(A + B) - (A + 2B) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow A^2 = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

b) $(A^2 + 2I)X = 3I + (A + B)^T$

$$\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 7 & 0 \\ -1 & 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 24 & -15 \\ -6 & 30 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 8 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

Pregunta 2. Números y Álgebra. (2 puntos)

Discuta, según los valores del parámetro m , el siguiente sistema:
$$\begin{cases} mx + (m + 2)y + z = 3 \\ 2mx + 3my + 2z = 5 \\ (m - 4)y + mz = m \end{cases}$$

Respuesta.

$$|A| = \begin{vmatrix} m & m+2 & 1 \\ 2m & 3m & 2 \\ 0 & m-4 & m \end{vmatrix} = m^3 - 4m^2 = m^2(m - 4)$$

$$m \neq 0, 4 \Rightarrow |A| \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = \text{rg}(A^*) = 3 \Rightarrow \text{s. c. d.}$$

$$m = 0 \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = 2 \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 5 \\ -4 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A^*) = 3 \end{cases} \Rightarrow \text{s. i.}$$

$$m = 4 \Rightarrow \begin{cases} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A) = 2 \\ \begin{vmatrix} 6 & 1 & 3 \\ 12 & 2 & 5 \\ 0 & 4 & 4 \end{vmatrix} = 24 \neq 0 \Rightarrow \text{rg}(A^*) = 3 \end{cases} \Rightarrow \text{s. i.}$$

(Se han utilizado las dos/tres últimas columnas y filas de la matriz ampliada en cada caso)

Para $m = 4$ basta ver que la 1ª y 2ª ecuaciones son incompatibles, pues $2 \cdot 1^a - 2^a \Rightarrow 0 = 1$.

Pregunta 3. Análisis. (2 puntos)

- a) Enuncie los teoremas de Rolle y Bolzano.
b) Calcule $\int x^3 e^{x^2}$.

Respuesta:

- a) Teorema de Rolle: «Si f es una función continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) , y $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$ ».
Teorema de Bolzano: «Si f es una función continua en $[a, b]$ y $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$ ».
- b) $\int x^3 e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int x^2 (2x e^{x^2}) dx = \frac{1}{2} x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2} \int 2x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} x^2 e^{x^2} - \frac{1}{2} e^{x^2} + C = \frac{1}{2} (x^2 - 1) e^{x^2} + C$
 $u = x^2 \Rightarrow du = 2x dx$
 $dv = 2x e^{x^2} dx \Rightarrow v = e^{x^2}$

Pregunta 4. Análisis. (2 puntos)

Calcule los siguientes límites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x}$ b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x^2}$

Respuesta:

- a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x \sin x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \frac{1}{1+x}}{\sin x + x \cos x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x + \frac{1}{(1+x)^2}}{2 \cos x - x \sin x} = \frac{1}{2}$
- b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^x}{x^2} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} \cos x - e^x}{2x} \stackrel{L'H}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} (\cos^2 x - \sin x) - e^x}{2} = \frac{0}{2} = 0$

Nota: Antes de aplicar la regla de L'Hôpital debe comprobarse que numerador y denominador tienden ambos a 0 o ambos a ∞ (a 0 en todos los casos de este problema).

Pregunta 5. Geometría. (2 puntos)

- a) Considérese el plano $\pi: 4x + 2y + bz = 2$ y la recta $r: \frac{x-2}{3} = \frac{y-c}{2} = \frac{z-3}{4}$, donde b y c son parámetros reales. Calcule los valores que tienen que tomar b y c para que la recta r esté contenida en π .
- b) Calcule la distancia del punto $P(1, 3, 1)$ al plano $\pi': 4x + 2y - 4z = 2$.

Respuesta:

- a) El vector director de la recta y el vector normal al plano deben ser perpendiculares: $(4, 2, b) \cdot (3, 2, 4) = 16 + 4b = 0 \Rightarrow \boxed{b = -4} \Rightarrow \pi: 4x + 2y - 4z = 2$

El punto $(2, c, 3)$ por el que pasa la recta, debe estar en el plano:

$$4 \cdot 2 + 2 \cdot c - 4 \cdot 3 = 2 \Rightarrow \boxed{c = 3}$$

- b) $D(P, \pi') = \frac{|4 \cdot 1 + 2(-1) - 4(-1) - 2|}{\sqrt{4^2 + 2^2 + (-4)^2}} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$

Pregunta 6. Geometría. (2 puntos)

- a) Considérense los puntos $Q(-1,3,-5)$, $R(3,1,0)$ y $S(0,1,2)$. Obtenga la ecuación implícita o general del plano π que contiene a Q , R y S .
- b) Obtenga las ecuaciones paramétricas y la ecuación continua de la recta que pasa por el punto $P(3,-1,-1)$ y sea perpendicular al plano $\pi: 4x + 23y + 6z - 35 = 0$.

Respuesta:

- a) Si $P(x, y, z)$ es un punto cualquiera del plano, los vectores \overrightarrow{QP} , \overrightarrow{QR} y \overrightarrow{QS} deben ser coplanarios, por lo que su ecuación será:

$$\pi: \begin{vmatrix} x+1 & y-3 & z+5 \\ 4 & -2 & 5 \\ 1 & -2 & 7 \end{vmatrix} = -4(x+1) - 23(y-3) - 6(z+5) = -4x - 23y - 6z + 35 = 0$$

O, cambiándole el signo, $\pi: 4x + 23y + 6z - 35 = 0$

- b) El vector director de la recta es $\vec{v} = (4, 23, 6)$ y ha de pasar por P , luego:

$$r: \begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = -1 + 23t \\ z = -1 + 6t \end{cases}, r: \frac{x-3}{4} = \frac{y+1}{23} = \frac{z+1}{6}$$

Pregunta 7. Estadística y probabilidad. (2 puntos)

Sabiendo que $P(A) = \frac{1}{3}$ y $P(B) = \frac{1}{2}$,

- a) Suponiendo que A y B son sucesos independientes, calcule $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} | (\bar{A} \cup \bar{B}))$.
- b) Suponiendo que A y B son sucesos incompatibles, calcule $P(A \cup B)$ y $P(\bar{A} | (\bar{A} \cup \bar{B}))$.

(Nota: \bar{A} y \bar{B} son los sucesos contrarios de A y B respectivamente)

Respuesta:

- a) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Si se trata de sucesos independientes, $P(A \cap B) =$

$$P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6} \text{ y:}$$

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(\bar{A} | (\bar{A} \cup \bar{B})) = \frac{P(\bar{A} \cap (\bar{A} \cup \bar{B}))}{P(\bar{A} \cup \bar{B})} = \frac{P(\bar{A})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})} = \frac{1 - P(A)}{1 - P(A \cap B)} = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{5}{6}} = \frac{4}{5}$$

- b) Si se trata de sucesos incompatibles, $P(A \cap B) = 0$ y:

$$P(A \cup B) = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}$$

$$P(\bar{A} | (\bar{A} \cup \bar{B})) = \frac{P(\bar{A} \cap (\bar{A} \cup \bar{B}))}{P(\bar{A} \cup \bar{B})} = \frac{P(\bar{A})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})} = \frac{1 - P(A)}{1 - P(A \cap B)} = \frac{1 - \frac{1}{3}}{1 - 0} = \frac{2}{3}$$

Pregunta 8. Estadística y probabilidad. (2 puntos)

Una máquina que distribuye agua en botellas echa una cantidad de agua que sigue una distribución normal con media igual a 500 mililitros y desviación típica igual a 4 mililitros.

- Si elegimos al azar una de las botellas, ¿cuál es la probabilidad de que lleve entre 499 y 502 mililitros?
- ¿Cuál es la cantidad de agua, en mililitros, excedida por el 97,5% de estas botellas?

Respuesta:

Se trata de una normal $N(500, 4)$. Sea $p(Z)$ la probabilidad de que una variable con distribución $N(0, 1)$ sea menor o igual que Z .

$$\begin{aligned} \text{a) } P(499 \leq X \leq 502) &= p\left(\frac{502-500}{4}\right) - p\left(\frac{499-500}{4}\right) = p(0.5) - p(-0.25) \\ &= 0.6915 - (1 - p(0.25)) = 0.6915 + 0.5987 - 1 = 0.2902 \end{aligned}$$

- b) Sea X_0 tal cantidad. Claramente es $X_0 < 500$, la media.

$$\begin{aligned} P(X > X_0) &= 1 - P(X \leq X_0) = 0.975 \Rightarrow P(X \leq X_0) = p\left(\frac{X_0 - 500}{4}\right) \\ &= 1 - p\left(\frac{500 - X_0}{4}\right) = 0.025 \Rightarrow p\left(\frac{500 - X_0}{4}\right) = 0.975 \Rightarrow \frac{500 - X_0}{4} \\ &= 1.96 \Rightarrow X_0 = 500 - 4 \cdot 1.96 = 492.16 \text{ ml} \end{aligned}$$

Ignacio Larrosa carrasco